

UN

NABIDE NOUVEAU DU TRANSVAAL

PAR

le Dr H. SCHOUTEDEN

(Musée du Congo belge, Tervueren).

Gorpis transvaalensis n. sp.

D'un jaune-paille légèrement obscurci; très brillant en dessous, peu en dessus, les élytres mats, à l'exception de la partie distale de la membrane qui est fort brillante.

Pronotum à vague ligne médiane et deux lignes submarginales sombres. Clavus sombre presque en entier, plus clair vers l'écusson. Corie avec l'extrême base et apex foncés, la région médiane enfumée, la région apicale un peu teintée de rougeâtre. Membrane à région basale (jusqu'au niveau de l'apex de la corie) d'un brun foncé mat, le reste hyalin et très brillant; la partie basale sombre se termine en \vee distalement. Mésopleures avec un point noir en dehors, un autre en dedans, sur la même ligne qu'un point marquant les métapleures. Connexivum à segments fasciés distalement de sombre. Antennes à premier article un peu rembruni latéralement à la base, l'extrémité brun foncé; article supplémentaire brun foncé également; deuxième article noir à l'extrême bout. Hanches antérieures assombries légèrement en avant. Fémurs antérieurs avec deux anneaux brun foncé, l'un médian, l'autre vers le quart apical. Fémurs intermédiaires et postérieurs avec deux anneaux, l'un postmédian, l'autre antéapical. Tous les tibias à anneau subbasal et apex sombres. Tarses sombres au bout. Antennes à premier article plus court que le deuxième, celui-ci plus court que le troi-